Hémoculture par ponction veineuse directe

Version 3
Mai 2017

1

Avant le prélèvement, marquer un trait sur chaque flacon anaérobie et pédiatrique pour la limite du volume sanguin à prélever.
Flacon anaérobie : **2 graduations soit 10 ml** à prélever
Flacon aérobie : utiliser le repère visuel
Flacon pédiatrique : selon poids enfant, 1 graduation = 4ml
Vérifier la date de péremption notée sur chaque flacon
Vérifier que la couleur du culot du flacon est gris-vert

2

Retirer la capsule de protection sur le bouchon des flacons

3

Désinfecter les bouchons et laisser sécher 30-60 secondes

4

Friction des mains

5

Désinfecter la zone de prélèvement à l'aide d'une solution alcoolique antiseptique

6

VISSER à fond l'adaptateur BacT/ALERT au dispositif de prélèvement

7

Pratiquer la ponction veineuse à l'aide de l'aiguille

8

Attention un volume de remplissage optimum conditionne la sensibilité du diagnostic

1) Placer l'adaptateur sur le flacon aérobie en pressant le long du flacon. Remplir jusqu'au repère visuel.
2) puis sur le flacon anaérobie. Remplir jusqu'au trait manuel.

ou

1 Flacon pédiatrique unique

9

Si des tubes de sang doivent être prélevés, insérer le réducteur BacT/ALERT dans l'adaptateur et remplir les tubes

10

Retirer le dispositif de prélèvement des flacons. Désinfecter à nouveau les bouchons des flacons. **Mélanger doucement** 2/3 fois chaque flacon